

Co robić, gdy poparzył nas barszcz Sosnowskiego?



Straż pożarna i lekarze ostrzegają przed groźnym barszczem Sosnowskiego – trującą rośliną, która może powodować oparzenia drugiego stopnia.

Wydzielane przez barszcz Sosnowskiego olejki eteryczne, w kontakcie ze skórą, w obecności światła słonecznego, powodują oparzenia drugiego i trzeciego stopnia. Objawy pojawiają się już w ciągu od 30 minut do 2 godzin od kontaktu z rośliną. Jeśli doszło już do kontaktu z rośliną, należy niezwłocznie i dokładnie przemyć skórę wodą z mydłem i unikać ekspozycji podrażnionych miejsc na słońce, przynajmniej przez 48 godzin. W przypadku kontaktu soku roślin z oczami, należy je przemyć dokładnie wodą i chronić przed światłem (nosić okulary z filtrem chroniącym przed ultrafioletem). Jeśli doszło do podrażnienia skóry, objawy zapalne zmniejsza zastosowanie miejscowo maści (kremów). Należy zgłosić się też do lekarza. Przebieg oparzenia może być łagodny, ale zależy od wrażliwości organizmu. W najgorszych przypadkach dochodzi do martwicy tkanek.

Barszcz Sosnowskiego został sprowadzony z Kaukazu i był początkowo hodowany jako pasza dla zwierząt. Później, ze względu m.in. na jej toksyczność, uprawy zostały porzucone. Roślina wciąż jednak występuje przede wszystkim w Polsce południowo-wschodniej oraz południowo-zachodniej.

Barszcz Sosnowskiego osiąga od 1-4 metrów wysokości, u dołu zwykle pokryty jest purpurowymi plamkami. Jest mrozoodporny, starsze odmiany tolerują temperaturę do -25 stopni Celsjusza.

Przykłady poparzeń skóry barszczem Sosnowskiego:



Na skórze pojawia się najpierw zaczerwienienie, potem świąd, pieczenie i pęcherze wypełnione płynem surowicznym





Mapa występowania barszczu Sosnowskiego:

